

### \* FATTORI GENERALI

bronchiti ricorrenti/ tosse	1
attività lavorativa pesante 1	1

### \* FATTORI UROGINECOLOGICI

ius prima della gravidanza	4
ius tra due gravidanze	4
ius nel 1°/2° trim.	4
ius in puerperio	4
stipsi severa prima della gravidanza	1
stipsi severa in gravidanza	1
incontinenza a gas o feci	4

### \* FATTORI OSTETRICI

primipara	1
aumento ponderale > a 14 kg	1
parto precipitoso/ indotto	2
analgesia	1
manovre di kristeller	2
periodo espulsivo > a 60 min.	2
presentazione podalica / anomala	1
rotazione sacrale	1
manovre di disimpegno delle spalle	2
Ventosa ostetrica	2
peso neonato > 4000 gr	1
circonferenza cranica >35 cm	1
episiotomia paramediana	2
episiotomia mediana	2
lacerazione 1°	1
lacerazione 2°	2
lacerazione 3°	4
ematoma perineale	1
infezione perineale	1
cateterismo	2

### \* PUNTEGGIO TOTALE

TABELLA DEI RISULTATI

R1 0>3	R2 4-8	R3 >8
PRESA IN CARICO PER SEDUTE DI RIEDUCAZIONE E TERAPIA COMPORTAMENTALE	PRESA IN CARICO PER BREVE CICLO SEDUTE DI EDUCAZIONE/RIABILITAZIONE	INVIO AMBULATORIO DI UROGINECOLOGIA /PROCTOLOGIA E SUCCESSIVA RIABILITAZIONE